



HYPPOLAC

POUR LE REMPLACEMENT DU LAIT MATERNEL

1. USAGE RECOMMANDÉ

Cavalor Hyppolac est un lait soluble très digestible, dont les qualités nutritionnelles sont similaires à celles du lait de jument naturel.

Pendant les premières semaines de sa vie, le poulain est entièrement dépendant du lait de la jument. Un lait suffisamment nourrissant est essentiel pour une croissance régulière et un bon développement. Cavalor Hyppolac est un lait soluble de qualité, destiné aux poulains orphelins ou aux poulains dont la mère ne dispose pas de suffisamment de lait de qualité.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS

Cavalor Hyppolac contient des minéraux et des vitamines de grande qualité qui sont bien assimilés. Outre des vitamines A, D3 et E, ce lait de substitution riche en énergie contient du calcium, du cuivre, du fer, du manganèse, du zinc, du sélénium, de la lysine, de la méthionine et d'autres acides aminés essentiels afin de satisfaire les besoins des poulains.

PROTÉINES BRUTES → 23,00 %	MANGANÈSE → 50,00 mg/kg	
VITAMINE A → 25 000 UI/kg	SÉLÉNIUM → 0,25 mg/kg	CALCIUM → 1,00 %
VITAMINE E → 100 mg/kg	MATIÈRES GRASSES BRUTES → 15,50 %	FER → 80,00 mg/kg
CUIVRE → 3,00 mg/kg	VITAMINE D3 → 4000 UI/kg	ZINC → 55,00 mg/kg

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS

3. MODE D'EMPLOI

Administrez Cavalor Hyppolac au biberon ou dans un seau. La concentration idéale est de 135 g de Cavalor Hyppolac par litre d'eau. La quantité de lait par repas et le nombre de repas figurent dans le tableau ci-dessous.

Délaissez la quantité nécessaire de Cavalor Hyppolac dans la moitié de la quantité d'eau à 60 °C. Mélangez bien la poudre, jusqu'à sa dissolution complète. Ensuite, ajoutez de l'eau tiède au mélange, jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée de 40 °C.

En cas de diarrhée, la dose peut être modifiée en 65 g de Cavalor Hyppolac par litre d'eau. Lorsque la diarrhée diminue, la dose peut être à nouveau augmentée, jusqu'à la concentration recommandée normale. En cas de diarrhée, consultez toujours un vétérinaire.

Attention : Cavalor Hyppolac doit toujours être dissous dans de l'eau. Épandre Cavalor Hyppolac sur l'aliment peut provoquer une occlusion œsophagienne.

ÉLEVAGE

Age in days / Leeftijd in dagen / Age en jours / Alter in Tagen:	Number of meals a day / Aantal maaltijden per dag / Nombre de repas par jour / Portionen pro Tag:	Quantity per day / Hoeveelheid per dag / Quantité par jour / Quantität pro Tag:	Quantity per meal / Hoeveelheid per maaltijd / Quantité par repas / Quantität pro Portion:
1-2	18	6,5 L	± 350-400 ml
3-4	16	7 L	± 400-150 ml
5-6	14	7,5 L	± 500-550 ml
7-8	12	8 L	± 650-700 ml
9-10	10	9 L	± 900 ml
11-12	8	10 L	± 1250 ml
13-14	8	11,5 L	± 1250-1500 ml
15-16	6	13 L	± 2000-2500 ml
17-18	6	14,5 L	± 2000-2500 ml
19-21	6	15 L	± 2500 ml
Age in weeks / Leeftijd in weken / Age en semaines / Alter in wochen:			
4-5	6	15 L	± 2500 ml
6-12	4	15 L	± 3750 ml
13-14	4	12 L	± 3000 ml
15-16	4	10 L	± 2500 ml

4. EMBALLAGE ET CONSERVATION

#/DOSE	CODE EAN	EMBALLAGE
1	 5425016900406	Cavalor® Hyppolac 10 kg - 22 lb

